



Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



- Sie sind entsprechend trainiert – welche Maßnahme führen Sie im Rahmen einer Reanimation (CPR) neben Herzdruckmassagen zusätzlich durch?
- Abkürzung für Basismaßnahmen im Rahmen einer CPR
- Welches Medikament wird nach dem 3. erfolglosen Schock gegeben?
- Womit führen Sie die Herzdruckmassagen durch?
- Welche Maßnahme sollten Sie im Rahmen einer CPR möglichst durchgängig durchführen?
- ideale Frequenz für Herzdruckmassagen (.../min)
- Was müssen Sie als erstes überprüfen, wenn ein Patient auf Ansprache nicht reagiert?
- Welches Medikament wird im Rahmen einer Reanimation möglichst frühzeitig gegeben?
- Einheit der Energie bei einem Defibrillator
- Abkürzung für „Wiedereintritt des Spontankreislaufs“
- Manöver zum Überstrecken des Kopfes im Rahmen einer CPR
- Wie können Medikamente gegeben werden, wenn die Anlage eines i.v.-Zugangs nicht möglich ist?
- Abkürzung für erweiterte Maßnahmen im Rahmen einer Reanimation
- Abkürzung für ein wichtiges Gerät in der Laienreanimation
- Herzrhythmusstörung mit völlig unregelmäßigen und nicht voneinander abgrenzbaren Kammerkomplexen
- Gerät zur Abgabe von Schocks im Rahmen einer CPR
- ideale Drucktiefe für Herzdruckmassagen (in cm)
- Fachausdruck für den vollständigen Ausfall der elektrischen Aktivität des Herzens (Nulllinien-EKG)
- Bei Kindern sollen vor Beginn der Herzdruckmassagen Beatmungen durchgeführt werden. Wieviele?
- Was müssen Sie veranlassen, wenn ein Patient keine Reaktion und keine normale Atmung zeigt?
- Sie haben als trainierter Helfer bei einem Erwachsenen 30 Herzdruckmassagen durchgeführt. Wie oft beatmen Sie jetzt?

Lösungswort: **L E B E N S R E T T E R**



- Sie sind entsprechend trainiert – welche Maßnahme führen Sie im Rahmen einer Reanimation (CPR) neben Herzdruckmassagen zusätzlich durch?
- Abkürzung für Basismaßnahmen im Rahmen einer CPR
- Welches Medikament wird nach dem 3. erfolglosen Schock gegeben?
- Womit führen Sie die Herzdruckmassagen durch?
- Welche Maßnahme sollten Sie im Rahmen einer CPR möglichst durchgängig durchführen?
- ideale Frequenz für Herzdruckmassagen (.../min)
- Was müssen Sie als erstes überprüfen, wenn ein Patient auf Ansprache nicht reagiert?
- Welches Medikament wird im Rahmen einer Reanimation möglichst frühzeitig gegeben?
- Einheit der Energie bei einem Defibrillator
- Abkürzung für „Wiedereintritt des Spontankreislaufs“
- Manöver zum Überstrecken des Kopfes im Rahmen einer CPR
- Wie können Medikamente gegeben werden, wenn die Anlage eines i.v.-Zugangs nicht möglich ist?
- Abkürzung für erweiterte Maßnahmen im Rahmen einer Reanimation
- Abkürzung für ein wichtiges Gerät in der Laienreanimation
- Herzrhythmusstörung mit völlig unregelmäßigen und nicht voneinander abgrenzbaren Kammerkomplexen
- Gerät zur Abgabe von Schocks im Rahmen einer CPR
- ideale Drucktiefe für Herzdruckmassagen (in cm)
- Fachausdruck für den vollständigen Ausfall der elektrischen Aktivität des Herzens (Nulllinien-EKG)
- Bei Kindern sollen vor Beginn der Herzdruckmassagen Beatmungen durchgeführt werden. Wieviele?
- Was müssen Sie veranlassen, wenn ein Patient keine Reaktion und keine normale Atmung zeigt?
- Sie haben als trainierter Helfer bei einem Erwachsenen 30 Herzdruckmassagen durchgeführt. Wie oft beatmen Sie jetzt?