


## Ludwig\*

Ludwig ist ein 5 Monate alter Säugling. Seine Eltern sind verzweifelt, denn er hat seit ungefähr einer Woche Schwierigkeiten, seinen Stuhl zu entleeren, der sehr hart und trocken ist. Seine starken Bauchschmerzen zeigt er durch Anziehen der Beine und Schreiattacken, die etwa ½ Stunde andauern.

Ludwig wird von seiner Mutter, die im gleichen Zimmer mit Ludwig aufgenommen werden kann, noch voll gestillt. Ludwigs Mutter erzählt, dass Ludwig mehr als gewöhnlich trinken will und nur alle 2 Tage Stuhl entleert.

\* Fallbeispiel fiktiv, Namen frei erfunden

## Ludwig leidet an Bauchschmerzen.



Die Eltern leiden mit, empfinden großen Stress und Hilflosigkeit: Haben Sie ein offenes Ohr und gehen Sie auf Fragen ein. Foto: P. Bläfield, Thieme

## Auszug aus dem Pflegeplan von Ludwig.

PFLEGEPROBLEME	RESSOURCEN	PFLEGEZIELE	PFLEGEMASSNAHMEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ludwig hat aufgrund von hartem Stuhlgang starke Bauchschmerzen und zeigt seine Schmerzen durch Schreiattacken und Anziehen der Beine.</li> <li>Aufgrund unklarer Ursachen hat Ludwig eine verzögerte Stuhlausscheidung (Defäkation). Dies zeigt sich darin, dass nur alle zwei Tage Stuhl ausgeschieden wird.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ludwigs Mutter kann im Rooming-In-Zimmer mitaufgenommen werden.</li> <li>Ludwig trinkt sehr viel an der Brust seiner Mutter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ludwig ist vor und während der Defäkation schmerzfrei.</li> <li>Ludwig hat eine ungehinderte Defäkation und einen weichen Stuhl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ludwig auf dem Bauch und mit angewinkelten Beinchen positionieren bzw. herumtragen.</li> <li>Stuhlausscheidung mittels eines Reinigungseinlaufs mit ca. 20 ml angewärmter Muttermilch unterstützen.</li> <li>Ludwig zwischen den Mahlzeiten zusätzlich Fencheltee anbieten.</li> <li>Informations-/Beratungsgespräch mit der Mutter führen, um sie zu beruhigen und um sie in die Pflege/Umsetzung der Maßnahmen mit einzubeziehen.</li> <li>Nach Ausschluss von Kontraindikationen eine Bauchmassage durchführen.</li> </ul>